


# Алгоритм диагностики ГЭС



# Вариант ГЭС и лечение

**F/P М-ГЭС (как с мутацией F/P,  
так и только по клинико-  
гематологическим признакам)**

**PDGFRB  
М-ГЭС**

**FGFR1  
М-ГЭС**

**ИМАТИНИБ 100-400 мг ±  
преднизолон**  
Нилотиниб, сорафениб,  
понатиниб (мутации *T674I*  
и *D842V*)  
Гидроксимочевина,  
цитарабин, винкристин

**Иматиниб 400-800 мг  
± преднизолон**  
или  
Интерферон альфа

**Понатиниб;**  
**Анти-JAK2 и анти-  
FLT3 ингибиторы;**  
**Мидостаурин**

**Аллотрансплантация ПГСК**

Л-ГЭС

ХЭЛ-БДУ

СМ-эо

**ПРЕДНИЗОЛОН**  
Иматиниб 400-800 мг ±  
преднизолон  
Интерферон альфа ±  
Гидроксимочевина  
Меполизумаб  
Кладрибин;  
Алемтузумаб

Интерферон альфа ±  
Гидроксимочевина ±  
преднизолон  
Иматиниб 400 мг ±  
преднизолон  
Руксолитиниб (при  
*РСМ1-ЈАК2* или  
*ЈАК2V617F*)  
Цитарабин, винкрестин

Интерферон альфа  
Кладрибин  
Иматиниб 400-800 мг  
(*F/P*-позитивный или  
*Phe522Cys KIT*-  
позитивный СМ)  
Преднизолон  
Мидостаурин

**Аллотрансплантация ПГСК**

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ

СЕМЕЙНЫЙ ГЭС

Р/Р-НЕГАТИВНЫЙ М-ГЭС

НАБЛЮДЕНИЕ  
ИЛИ  
ПРЕДНИЗОН