

# АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ С ДИФфуЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ



\* КТ (ПЭТ)-контроль после 2 и(или) 4 цикла

### Подходы при особых ситуациях\*

1. Плазмобластная лимфома: СНОР-21 ± бортезомиб; R-ЕРОСН ± ВДХТ с ТАСКК
2. Лимфоматоидный гранулематоз: в начальной стадии – интерферон или ритуксимаб; при прогрессии - R-СНОР или R-ЕРОСН
3. Внутрисосудистая ДБККЛ: R-СНОР ± ВДХТ с ТАСКК + профилактика нейролейкоза
4. ДБККЛ с двойной транслокацией: R-ЕРОСН± ВДХТ с ТАСКК
5. Первичная медустиальная В-клеточная лимфома: при хорошем прогнозе – R-СНОР, в других ситуациях – R-МАСОР-В, DA-ЕРОСН-R
6. ДБККЛ с пограничными признаками лимфомы Беркитта: R-ЕРОСН± ВДХТ с ТАСКК
7. Лимфома с признаками, промежуточными между ПМВКЛ и классической лимфомой Ходжкина: R-СНОР + лучевая терапия на средостение

\* КТ (ПЭТ)-контроль после 2 и(или) 4 цикла